

■ 尿路上皮がん（膀胱がん、尿管がん、腎盂がん）

レジーム名	薬剤（略号）	用量	投与時間	投与日	1J-期間
GC	ゲムシタビン（GEM） シスプラチン（CDDP）	1000mg/m ² 70mg/m ²	30分 2時間	d1、d8、d15 d2	28日
GEM+CBDCA	ゲムシタビン（GEM） カルボプラチン（CBDCA）	1000mg/m ² AUC : 5	30分 60分	d1、d8 d1	21日
M-VAC	メトホルマート（MTX） ビンブラスチン（VLB） ドキシフルリジン（DXR） シスプラチン（CDDP）	30mg/m ² 3mg/m ² 30mg/m ² 70mg/m ²	60分 30分 30分 2時間	d1、d15、d22 d2、d15、d22 d2 d2	28日
GP	ゲムシタビン（GEM） パクリタキセル（PTX）	1000mg/m ² 200mg/m ²	30分 3時間	d1、d8、d15 d1	21日
Pembro	ペンブロシクマブ（Pembro）	200mg/body	30分	d1	21日
Pembro（倍量）	ペンブロシクマブ（Pembro）	400mg/body	30分	d1	42日
Ave（維持）	アベルスマブ（Ave）	10mg/kg	60分	d1	14日
Nivo（術後補助）	ニボルマブ（Nivo）	240mg/body	30分	d1	14日
Nivo（倍量・術後補助）	ニボルマブ（Nivo）	480mg/body	30分	d1	28日
EV	エビシマブ ベドチン（EV）	1.25mg/kg	30分	d1、d8、d15	28日
THP膀胱注入	THP	30mg/body	TUR-BT翌日に膀胱内に注入	d1	-