

■ 子宮頸がん

レジメン名	薬剤 (略号)	用量	投与時間	投与日	11-1期間
TC	パクリタセル (PTX)	175mg/m ²	3時間	d1	21日
	カルボプラチン (CBDCA)	AUC : 5-6	60分	d1	
TC+Bv	パクリタセル (PTX)	175mg/m ²	3時間	d1	21日
	カルボプラチン (CBDCA)	AUC : 5-6	60分	d1	
	ベパリスチン (Bv)	15mg/kg	60分 (初回90分)	d1	
TP	パクリタセル (PTX)	135mg/m ²	24時間持続	d1-	21日
	シスプラチン (CDDP)	50mg/m ²	2時間	d2	
TP+Bv	パクリタセル (PTX)	135mg/m ²	24時間持続	d1-2	21日
	シスプラチン (CDDP)	50mg/m ²	2時間	d2	
	ベパリスチン (Bv)	15mg/kg	60分 (初回90分)	d2	
CDDP+RT	シスプラチン (CDDP) 放射線 (RT)	40mg/m ²	60分	d1	7日
CPT-11	イリリカ (CPT-11)	100mg/m ²	90分	d1、d8、d15	28日
ETP	エトポシド (ETP)	経口 50mg/日	1日1回	d1-21	28-35日