

■ 卵巣がん

レジメン名	薬剤 (略号)	用量	投与時間	投与日	13-7期間
TC	パクリタセル (PTX)	175mg/m ²	3時間	d1	21日
	カルボプラチン (CBDCA)	AUC : 5-6	60分	d1	
dose-dense TC	パクリタセル (PTX)	80mg/m ²	60分	d1、d8、d15	21日
	カルボプラチン (CBDCA)	AUC : 5-6	60分	d1	
weekly TC	パクリタセル (PTX)	70mg/m ²	60分	d1、d8、d15	28日
	カルボプラチン (CBDCA)	AUC : 2	60分	d1、d8、d15	
TC+Bv	パクリタセル (PTX)	175mg/m ²	3時間	d1	21日
	カルボプラチン (CBDCA)	AUC : 5-6	60分	d1	
	ベパシズマブ (Bv)	15mg/kg	30-90分 (初回90分)	d1	
Bv維持	ベパシズマブ (Bv)	15mg/kg	30-90分 (初回90分)	d1	21日
DC	ドセタセル (DTX)	70mg/m ²	60分	d1	21日
	カルボプラチン (CBDCA)	AUC : 5	60分	d1	
CPT-11	イリリカ (CPT-11)	100mg/m ²	90分	d1、d8、d15	28日
CPT-P	イリリカ (CPT-11)	60mg/m ²	2時間	d1、d8、d15	28日
	シスプラチン (CDDP)	60mg/m ²	2時間	d1	
NDP	ネダプラチン (NDP)	90mg/m ²	2時間	d1	28日
PLD	リポソーム化ドセタセル (PLD)	50mg/m ²	90分-2時間	d1	28日
PLDC	リポソーム化ドセタセル (PLD)	30mg/m ²	60分	d1	21日
	カルボプラチン (CBDCA)	AUC : 5	60分	d1	
GEM	ゲムシタビン (GEM)	1000mg/m ²	30分	d1、d8、d15	28日
GC	ゲムシタビン (GEM)	1000mg/m ²	30分	d1、d8	21日
	カルボプラチン (CBDCA)	AUC : 4	60分	d1	
NGT	キターカ (NGT)	1.5mg/m ²	30分	d1-5	21日
Olaparib	オラパリブ (Olaparib)	600mg/日	1日2回	連日	-
Bv+Olaparib	ベパシズマブ (Bv)	15mg/kg	30-90分 (初回90分)	d1	21日
	オラパリブ (Olaparib)	600mg/日	1日2回	d1-21	