

## Atezolizumab+nab-PTX 【アテゾリスマブ+アルブミン懸濁型パクリタセル】

### 【適応】 乳がん

無治療の、PD-L1陽性、HER2受容体陰性、HER2陰性の手術不能または再発乳がん

### 【使用薬剤】 ※ 薬品名は一般名で表記しています

アテゾリスマブ〔注〕【略号：Atezolizumab】

アルブミン懸濁型パクリタセル〔注〕【略号：nab-PTX】

### 【スケジュール】

		Day	1	...	8	...	15	...	22	...	28
Atezolizumab	840 mg/body 点滴静注 60分		●				●				
nab-PTX	100 mg/m <sup>2</sup> 点滴静注 30分		●		●		●				

1コース期間：28日

### 【治療内容】

#### ● 各コース共通 Day1、Day15

1	デキサメタゾン注 6.6mg/2mL 生理食塩液 100mL 点滴静注 30分	0.5v 1瓶	吐き気予防 アレルギー-予防	
2	アテゾリスマブ注 生理食塩液 250mL 点滴静注 60分	840 mg/body 1袋	抗がん剤	インラインフィルター付きキット使用
3	生理食塩液 50mL 点滴静注 全開	1瓶	フラッシュ用	
4	パクリタセル注 (アルブミン懸濁型) 生理食塩液 50mL 点滴静注 30分	100 mg/m <sup>2</sup> 1瓶	抗がん剤	
5	生理食塩液 50mL 点滴静注 全開	1瓶	フラッシュ用	

● 各コース共通 Day8

1	テチマゲバン注 6.6mg/2mL 生理食塩液 50mL 点滴静注 30分	0.5v 1瓶	吐き気予防 アレルギー-予防	
2	パクリタセル注 (アルブミン懸濁型) 生理食塩液 50mL 点滴静注 30分	100 mg/m <sup>2</sup> 1瓶	抗がん剤	
3	生理食塩液 50mL 点滴静注 全開	1瓶	フラッシュ用	

【注意する副作用】

- ◆ アレルギー (過敏症)
- ◆ 骨髄抑制 (白血球・好中球減少、貧血、血小板減少)
- ◆ 悪心・嘔吐
- ◆ 食欲不振
- ◆ 口内炎
- ◆ 味覚異常
- ◆ 下痢
- ◆ 便秘
- ◆ 脱毛
- ◆ 末梢神経障害
- ◆ 筋肉痛・関節痛
- ◆ 倦怠感
- ◆ 免疫関連有害事象 (irAE)
  - ・ 間質性肺疾患
  - ・ 大腸炎、重度の下痢
  - ・ 重度の皮膚障害
  - ・ 神経障害 (ギラン・バレー症候群など)
  - ・ 肝機能障害
  - ・ 内分泌障害 (甲状腺機能障害、下垂体機能障害、副腎機能障害)
  - ・ 1型糖尿病
  - ・ 腎機能障害
  - ・ 膵炎
  - ・ 筋炎・横紋筋融解症
  - ・ 重症筋無力症
  - ・ 心筋炎
  - ・ 脳炎・髄膜炎
  - ・ 免疫性血小板減少性紫斑病
  - ・ 溶血性貧血
  - ・ 赤芽球癆
  - ・ 点滴時の過敏反応 (Infusion reaction)
  - ・ ぶどう膜炎

など