

## Eribulin 【エリブリン】

【適応】 乳がん

進行・再発：PDまで

【使用薬剤】 ※ 薬品名は一般名で表記しています

エリブリン（注）【略号：Eribulin】

【スケジュール】

		Day	1	…	8	…	15	…	21
Eribulin	1.4 mg/m <sup>2</sup> 点滴静注 60分		●		●				

1コース期間：21日

【治療内容】

● 各コース共通 Day1、Day8

1	デキサメタゾン注 6.6mg/2mL 生理食塩液 50mL 点滴静注 15分	1v 1瓶	吐き気予防
2	エリブリン注 生理食塩液 50mL 点滴静注 全開	1.4 mg/m <sup>2</sup> 1瓶	抗がん剤
3	生理食塩液 50mL 点滴静注 全開	1瓶	フラッシュ用

【注意する副作用】

- ◆ 骨髄抑制（白血球・好中球減少、貧血、血小板減少）
  - ◆ 悪心・嘔吐
  - ◆ 食欲不振
  - ◆ 口内炎
  - ◆ 下痢
  - ◆ 便秘
  - ◆ 味覚異常
  - ◆ 脱毛
  - ◆ 末梢神経障害
  - ◆ 倦怠感
  - ◆ 爪の変化
- など