

GEM+Trastuzumab 【ゲムシタビン+トラスツズマブ】

【適応】 乳がん（HER2陽性）

進行・再発：PDまで

【使用薬剤】 ※ 薬品名は一般名で表記しています

ゲムシタビン〔注〕 【略号：GEM】

トラスツズマブ〔注〕 【略号：Trastuzumab】

【スケジュール】

● 1コース目

		Day	1	...	8	...	15	...	21
GEM	1,250 mg/m ² 点滴静注 30分		●		●				
Trastuzumab	8 mg/kg 点滴静注 90分		●						

1コース期間：21日

● 2コース目以降

		Day	1	...	8	...	15	...	21
GEM	1,250 mg/m ² 点滴静注 30分		●		●				
Trastuzumab	6 mg/kg 点滴静注 60分		●						

1コース期間：21日

トラスツズマブは初回投与時の忍容性が良好であれば、2コース目以降は60分に短縮可能

トラスツズマブは28日以上間隔があいた場合は、再度8mg/kgから投与を開始する

【治療内容】

● 11-日目 Day1

1	ゲラセトリン点滴静注パック 3mg/100mL 点滴静注 30分	1袋	吐き気予防	
2	ゲムシタニン注 5%ブドウ糖注 100mL 点滴静注 30分	1,250 mg/m ² 1瓶	抗がん剤	
3	トラスツマブ注 生理食塩液 250mL 点滴静注 90分	8 mg/kg 1袋	抗がん剤	

● 11-日目 Day8

1	ゲラセトリン点滴静注パック 3mg/100mL 点滴静注 30分	1袋	吐き気予防	
2	ゲムシタニン注 5%ブドウ糖注 100mL 点滴静注 30分	1,250 mg/m ² 1瓶	抗がん剤	

● 21-日目以降 Day1

1	ゲラセトリン点滴静注パック 3mg/100mL 点滴静注 30分	1袋	吐き気予防	
2	ゲムシタニン注 5%ブドウ糖注 100mL 点滴静注 30分	1,250 mg/m ² 1瓶	抗がん剤	
3	トラスツマブ注 生理食塩液 250mL 点滴静注 60分	6 mg/kg 1袋	抗がん剤	

トラスツマブは初回投与時の忍容性が良好であれば、21-日目以降は60分に短縮可能

トラスツマブは28日以上間隔があいた場合は、再度8mg/kgから投与を開始する

● 21-日目以降 Day8

1	ゲラセトリン点滴静注パック 3mg/100mL 点滴静注 30分	1袋	吐き気予防	
2	ゲムシタニン注 5%ブドウ糖注 100mL 点滴静注 30分	1,250 mg/m ² 1瓶	抗がん剤	

【注意する副作用】

- ◆ 点滴時の過敏反応（Infusion reaction）
 - ◆ 骨髄抑制（白血球・好中球減少、貧血、血小板減少）
 - ◆ 間質性肺炎
 - ◆ 悪心・嘔吐
 - ◆ 食欲不振
 - ◆ 口内炎
 - ◆ 味覚異常
 - ◆ 下痢
 - ◆ 便秘
 - ◆ 倦怠感
 - ◆ 発熱
 - ◆ 血管痛
 - ◆ 心毒性
- など