

## nab-PTX+Trastuzumab 【アルブミン懸濁型パクリタキセル+トラスツズマブ】

【適応】 乳がん（HER2陽性）

進行・再発：PDまで

【使用薬剤】 ※ 薬品名は一般名で表記しています

アルブミン懸濁型パクリタキセル〔注〕【略号：nab-PTX】

トラスツズマブ〔注〕【略号：Trastuzumab】

【スケジュール】

● 1コース目

		Day	1	...	8	...	15	...	21
nab-PTX	260 mg/m <sup>2</sup> 点滴静注 30分		●						
Trastuzumab	8 mg/kg 点滴静注 90分		●						

1コース期間：21日

● 2コース目以降

		Day	1	...	8	...	15	...	21
nab-PTX	260 mg/m <sup>2</sup> 点滴静注 30分		●						
Trastuzumab	6 mg/kg 点滴静注 60分		●						

1コース期間：21日

トラスツズマブは初回投与時の忍容性が良好であれば、2コース目以降は60分に短縮可能

トラスツズマブは28日以上間隔があいた場合は、再度8mg/kgから投与を開始する

【治療内容】

● 11-日目 Day1

1	トラスツマブ注 生理食塩液 250mL 点滴静注 90分	8 mg/kg 1袋	抗がん剤	
2	デキサメタゾン注 6.6mg/2mL 生理食塩液 100mL 点滴静注 30分	1v 1瓶	吐き気予防 アレルギー-予防	
3	アルブミン懸濁型H <sup>2</sup> レクチン注 生理食塩液 50mL 点滴静注 30分	260 mg/m <sup>2</sup> 1瓶	抗がん剤	
4	生理食塩液 50mL 点滴静注 全開	1瓶	フラッシュ用	

● 21-日目以降 Day1

1	トラスツマブ注 生理食塩液 250mL 点滴静注 60分	6 mg/kg 1袋	抗がん剤	
2	デキサメタゾン注 6.6mg/2mL 生理食塩液 100mL 点滴静注 30分	1v 1瓶	吐き気予防 アレルギー-予防	
3	アルブミン懸濁型H <sup>2</sup> レクチン注 生理食塩液 50mL 点滴静注 30分	260 mg/m <sup>2</sup> 1瓶	抗がん剤	
4	生理食塩液 50mL 点滴静注 全開	1瓶	フラッシュ用	

トラスツマブは初回投与時の忍容性が良好であれば、21-日目以降は60分に短縮可能

トラスツマブは28日以上間隔があった場合は、再度8mg/kgから投与を開始する

【注意する副作用】

- ◆ アレルギー（過敏症）
  - ◆ 骨髄抑制（白血球・好中球減少、貧血、血小板減少）
  - ◆ 悪心・嘔吐
  - ◆ 食欲不振
  - ◆ 口内炎
  - ◆ 味覚異常
  - ◆ 下痢
  - ◆ 便秘
  - ◆ 脱毛
  - ◆ 末梢神経障害
  - ◆ 筋肉痛・関節痛
  - ◆ 倦怠感
  - ◆ 心毒性
- など