

## nab-PTX 【アルブミン懸濁型パクリタセル】

【適応】 乳がん

進行・再発：PDまで

【使用薬剤】 ※ 薬品名は一般名で表記しています

アルブミン懸濁型パクリタセル〔注〕 【略号：nab-PTX】

【スケジュール】

		Day	1	...	8	...	15	...	21
nab-PTX	260 mg/m <sup>2</sup> 点滴静注 30分		●						

1コース期間：21日

【治療内容】

● 各コース共通 Day1

1	テチマキゲン注 6.6mg/2mL 生理食塩液 100mL 点滴静注 30分	1v 1瓶	吐き気予防 アレルギー予防
2	アルブミン懸濁型パクリタセル注 生理食塩液 50mL 点滴静注 30分	260 mg/m <sup>2</sup> 1瓶	抗がん剤
3	生理食塩液 50mL 点滴静注 全開	1瓶	フラッシュ用

【注意する副作用】

- ◆ アレルギー（過敏症）
- ◆ 骨髄抑制（白血球・好中球減少、貧血、血小板減少）
- ◆ 悪心・嘔吐
- ◆ 食欲不振
- ◆ 口内炎
- ◆ 味覚異常
- ◆ 下痢
- ◆ 便秘
- ◆ 脱毛
- ◆ 末梢神経障害
- ◆ 筋肉痛・関節痛
- ◆ 倦怠感

など