

Pertuzumab+Trastuzumab+DTX 【パ°ルツス°マブ° +トラスツス°マブ° +ド°セタキセル】

【適応】 乳がん（HER2陽性）

術前・術後補助：4コース

進行・再発：PDまで

【使用薬剤】 ※ 薬品名は一般名で表記しています

パ°ルツス°マブ°〔注〕【略号：Pertuzumab】

トラスツス°マブ°〔注〕【略号：Trastuzumab】

ド°セタキセル〔注〕【略号：DTX】

【スケジュール】

● 1コース目

		Day	1	...	8	...	15	...	21
Pertuzumab	840 mg/body 点滴静注 60分		●						
Trastuzumab	8 mg/kg 点滴静注 90分		●						
DTX	60 mg/m ² 点滴静注 60分		●						

1コース期間：21日

● 2コース目以降

		Day	1	...	8	...	15	...	21
Pertuzumab	420 mg/body 点滴静注 60分		●						
Trastuzumab	6 mg/kg 点滴静注 60分		●						
DTX	60 mg/m ² 点滴静注 60分		●						

1コース期間：21日

パ°ルツス°マブ°は42日（6週間）以上間隔があいた場合は、再度840mg/bodyから投与を開始する

トラスツス°マブ°は初回投与時の忍容性が良好であれば、2コース目以降は60分に短縮可能

トラスツス°マブ°は28日（4週間）以上間隔があいた場合は、再度8mg/kgから投与を開始する

【治療内容】

● 1ｺｰｽ目 Day1

1	へﾟﾙｽﾞｽﾞマﾌﾞ注 生理食塩液 250mL 点滴静注 60分	840 mg/body 1袋	抗がん剤	
2	生理食塩液 50mL 点滴静注 30分	1瓶	経過観察	
3	ﾄﾗｽﾞｽﾞマﾌﾞ注 生理食塩液 250mL 点滴静注 90分	8 mg/kg 1袋	抗がん剤	
4	グﾗﾝゼﾄﾞの点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ 3mg/100mL デｷｽメﾀﾞﾘﾝ注 6.6mg/2mL 点滴静注 30分	1袋 1v	吐き気予防 ｱﾙﾐﾝ-予防	
5	ﾄﾞｷﾀﾞﾃﾙ注 5%ﾌﾞﾄﾞﾞ糖注 250mL 点滴静注 60分	60 mg/m ² 1瓶	抗がん剤	

● 2ｺｰｽ目以降 Day1

1	へﾟﾙｽﾞｽﾞマﾌﾞ注 生理食塩液 250mL 点滴静注 60分	420 mg/body 1袋	抗がん剤	
2	生理食塩液 50mL 点滴静注 30分	1瓶	経過観察	
3	ﾄﾗｽﾞｽﾞマﾌﾞ注 生理食塩液 250mL 点滴静注 60分	6 mg/kg 1袋	抗がん剤	
4	グﾗﾝゼﾄﾞの点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ 3mg/100mL デｷｽメﾀﾞﾘﾝ注 6.6mg/2mL 点滴静注 30分	1袋 1v	吐き気予防 ｱﾙﾐﾝ-予防	
5	ﾄﾞｷﾀﾞﾃﾙ注 5%ﾌﾞﾄﾞﾞ糖注 250mL 点滴静注 60分	60 mg/m ² 1瓶	抗がん剤	

へﾟﾙｽﾞｽﾞマﾌﾞは42日（6週間）以上間隔があいた場合は、再度840mg/bodyから投与を開始する

ﾄﾗｽﾞｽﾞマﾌﾞは初回投与時の忍容性が良好であれば、2ｺｰｽ目以降は60分に短縮可能

ﾄﾗｽﾞｽﾞマﾌﾞは28日（4週間）以上間隔があいた場合は、再度8mg/kgから投与を開始する

● 各ｺｰｽ共通 Day1夕-Day3朝

内服	デｷｽメﾀﾞﾘﾝ錠 4mg 1日2回 朝・夕食後 2日分	1回1錠	浮腫み予防	
----	---------------------------------	------	-------	--

※ 浮腫み予防のお薬は、患者様の状態や既往などにより投与日数や投与量が変わることがあります

【注意する副作用】

- ◆ アレルギー（過敏症）
 - ◆ 点滴時の過敏反応（Infusion reaction）
 - ◆ 骨髄抑制（白血球・好中球減少、貧血、血小板減少）
 - ◆ 悪心・嘔吐
 - ◆ 食欲不振
 - ◆ 口内炎
 - ◆ 下痢
 - ◆ 便秘
 - ◆ 味覚異常
 - ◆ 脱毛
 - ◆ 筋肉痛・関節痛
 - ◆ 末梢神経障害
 - ◆ 浮腫み
 - ◆ 倦怠感
 - ◆ 爪の変化
 - ◆ 流涙
 - ◆ 心毒性
- など