

Pertuzumab+Trastuzumab 【ハ°ルツゝマフゝ+トラスツゝマフゝ】

【適応】 乳がん（HER2陽性）

術後補助：14コース（Total 1年）

（Pertuzumab+Trastuzumab+DTXによる術前または術後補助療法4コース施行後）

【使用薬剤】 ※ 薬品名は一般名で表記しています

ハ°ルツゝマフゝ〔注〕 【略号：Pertuzumab】

トラスツゝマフゝ〔注〕 【略号：Trastuzumab】

【スケジュール】

- Pertuzumab+Trastuzumab+DTXによる術前または術後補助療法4コース施行後

		Day	1	...	8	...	15	...	21
Pertuzumab	420 mg/body 点滴静注 60分		●						
Trastuzumab	6 mg/kg 点滴静注 60分		●						

1コース期間：21日

ハ°ルツゝマフゝは42日（6週間）以上間隔があいた場合は、再度840mg/bodyから投与を開始する

トラスツゝマフゝは28日（4週間）以上間隔があいた場合は、再度8mg/kgから投与を開始する

【治療内容】

- 1コース目 Day1

1	ハ°ルツゝマフゝ注 生理食塩液 250mL 点滴静注 60分	420 mg/body 1袋	抗がん剤	
2	生理食塩液 50mL 点滴静注 30分	1瓶	経過観察	
3	トラスツゝマフゝ注 生理食塩液 250mL 点滴静注 60分	6 mg/kg 1袋	抗がん剤	

ハ°ルツゝマフゝは42日（6週間）以上間隔があいた場合は、再度840mg/bodyから投与を開始する

トラスツゝマフゝは28日（4週間）以上間隔があいた場合は、再度8mg/kgから投与を開始する

【注意する副作用】

- ◆ 点滴時の過敏反応 (Infusion reaction)
 - ◆ 悪心・嘔吐
 - ◆ 食欲不振
 - ◆ 口内炎
 - ◆ 下痢
 - ◆ 便秘
 - ◆ 味覚異常
 - ◆ 心毒性
- など