

PTX 【パクリタセル】

【適応】 乳がん

進行・再発：PDまで

【使用薬剤】 ※ 薬品名は一般名で表記しています

パクリタセル【注】 【略号：PTX】

【スケジュール】

		Day	1	...	8	...	15	...	21
PTX	175 mg/m ² 点滴静注 3時間		●						

1コース期間：21日

【治療内容】

● 各コース共通 Day1

経口	ジフェントリン錠 10mg パクリタセル投与の30分前までに服用	1回5錠	アレルギー-予防	
1	フェチジン注 20mg/2mL デキサメタゾン注 6.6mg/2mL 生理食塩液 50mL 点滴静注 15分	1A 1v 1瓶	吐き気予防 アレルギー-予防	
2	グラセトD点滴静注バッグ 3mg/100mL 点滴静注 30分	1袋	吐き気予防	
3	パクリタセル注 5%ブドウ糖注 500mL 点滴静注 3時間	175 mg/m ² 1袋	抗がん剤	インラインフィルター付きルート使用

【注意する副作用】

- ◆ アレルギー（過敏症）
- ◆ 骨髄抑制（白血球・好中球減少、貧血、血小板減少）
- ◆ 悪心・嘔吐
- ◆ 食欲不振
- ◆ 口内炎
- ◆ 下痢
- ◆ 便秘
- ◆ 味覚異常
- ◆ 脱毛
- ◆ 筋肉痛・関節痛
- ◆ 末梢神経障害
- ◆ 倦怠感

など