

TC (DTX+CPA) 【ドセタキセル+シクロホスファミド】

【適応】 乳がん

術前・術後補助：4コース

【使用薬剤】 ※ 薬品名は一般名で表記しています

ドセタキセル〔注〕【略号：DTX】

シクロホスファミド〔注〕【略号：CPA】

【スケジュール】

		Day	1	...	8	...	15	...	21
DTX	75 mg/m ² 点滴静注 60分		●						
CPA	600 mg/m ² 点滴静注 30分		●						

1コース期間：21日

【治療内容】

● 各コース共通 Day1

1	グラセトD点滴静注バッグ 3mg/100mL デキサメタゾン注 6.6mg/2mL 点滴静注 30分	1袋 1v	吐き気予防
2	ドセタキセル注 5%ブドウ糖注 250mL 点滴静注 60分	75 mg/m ² 1瓶	抗がん剤
3	シクロホスファミド注 生理食塩液 100mL 点滴静注 30分	600 mg/m ² 1瓶	抗がん剤

● 各コース共通 Day1夕-Day3朝

内服	デキサメタゾン錠 4mg 1日2回 朝・夕食後 2日分	1回1錠	浮腫み予防
----	--------------------------------	------	-------

※ 浮腫み予防のお薬は、患者様の状態や既往などにより投与日数や投与量が変わることがあります

【注意する副作用】

- ◆ アレルギー（過敏症）
 - ◆ 骨髄抑制（白血球・好中球減少、貧血、血小板減少）
 - ◆ 悪心・嘔吐
 - ◆ 食欲不振
 - ◆ 口内炎
 - ◆ 下痢
 - ◆ 便秘
 - ◆ 味覚異常
 - ◆ 脱毛
 - ◆ 筋肉痛・関節痛
 - ◆ 末梢神経障害
 - ◆ 浮腫み
 - ◆ 倦怠感
 - ◆ 爪の変化
 - ◆ 流涙
 - ◆ 出血性膀胱炎
- など