

Trastuzumab emtansine 【トラスツズマブ エムタンシン】

【適応】 乳がん（HER2陽性）

進行・再発：PDまで

【使用薬剤】 ※ 薬品名は一般名で表記しています

トラスツズマブ エムタンシン〔注〕 【略号：Trastuzumab emtansine】

【スケジュール】

		Day	1	...	8	...	15	...	21
Trastuzumab emtansine	3.6 mg/kg		●						
	点滴静注 90分*								

※トラスツズマブ エムタンシン注は初回の投与時の忍容性が良好であれば、2コース目以降は30分まで短縮可能

1コース期間：21日

【治療内容】

● 各コース共通 Day1

1	グラセトリン点滴静注パック 3mg/100mL 1袋 デキサメタゾン注 6.6mg/2mL 1v 点滴静注 30分		吐き気予防 アレルギー予防	
2	トラスツズマブ エムタンシン注 3.6 mg/kg 生理食塩液 250mL 1袋 点滴静注 90分*		抗がん剤	インラインフィルター付きルート使用

※トラスツズマブ エムタンシン注は初回の投与時の忍容性が良好であれば、2コース目以降は30分まで短縮可能

【注意する副作用】

- ◆ 点滴時の過敏反応（Infusion reaction）
 - ◆ 骨髄抑制（白血球・好中球減少、貧血、血小板減少）
 - ◆ 悪心・嘔吐
 - ◆ 食欲不振
 - ◆ 口内炎
 - ◆ 下痢
 - ◆ 便秘
 - ◆ 味覚異常
 - ◆ 脱毛
 - ◆ 筋肉痛・関節痛
 - ◆ 末梢神経障害
 - ◆ 浮腫み
 - ◆ 倦怠感
 - ◆ 爪の変化
 - ◆ 流涙
 - ◆ 心毒性
- など