

Trastuzumab 【トラスツズマブ】

【適応】 乳がん（HER2陽性）

術後補助：18回（術前・術後にTrastuzumabを含む治療をしている場合は、合計して1年間まで

進行・再発：PDまで

【使用薬剤】 ※ 薬品名は一般名で表記しています

トラスツズマブ〔注〕【略号：Trastuzumab】

【スケジュール】

● 1回-回目

		Day	1	...	8	...	15	...	21
Trastuzumab	8 mg/kg 点滴静注 90分		●						

1回-回期間：21日

● 2回-回目以降

		Day	1	...	8	...	15	...	21
Trastuzumab	6 mg/kg 点滴静注 60分		●						

1回-回期間：21日

トラスツズマブは初回投与時の忍容性が良好であれば、2回-回目以降は60分に短縮可能

トラスツズマブは28日以上間隔があいた場合は、再度8mg/kgから投与を開始する

【治療内容】

● 1回-回目 Day1

1	トラスツズマブ注 生理食塩液 250mL 点滴静注 90分	8 mg/kg 1袋	抗がん剤	
---	-------------------------------------	---------------	------	--

● 2回-回目以降 Day1

1	トラスツズマブ注 生理食塩液 250mL 点滴静注 60分	6 mg/kg 1袋	抗がん剤	
---	-------------------------------------	---------------	------	--

トラスツズマブは初回投与時の忍容性が良好であれば、2回-回目以降は60分に短縮可能

トラスツズマブは28日以上間隔があいた場合は、再度8mg/kgから投与を開始する

【注意する副作用】

◆ 点滴時の過敏反応（Infusion reaction）

◆ 心毒性

など