

VNB+Trastuzumab 【ヒールルビン+トラスツスマブ】

【適応】 乳がん（HER2陽性）

進行・再発：PDまで

【使用薬剤】 ※ 薬品名は一般名で表記しています

ヒールルビン〔注〕 【略号：VNB】

トラスツスマブ〔注〕 【略号：Trastuzumab】

【スケジュール】

● 1コース目

		Day	1	...	8	...	15	...	21
VNB	25 mg/m ² 点滴静注 全開		●		●				
Trastuzumab	8 mg/kg 点滴静注 90分		●						

1コース期間：21日

● 2コース目以降

		Day	1	...	8	...	15	...	21
VNB	25 mg/m ² 点滴静注 全開		●		●				
Trastuzumab	6 mg/kg 点滴静注 60分		●						

1コース期間：21日

トラスツスマブは初回投与時の忍容性が良好であれば、2コース目以降は60分に短縮可能

トラスツスマブは28日（4週間）以上間隔があいた場合は、再度8mg/kgから投与を開始する

【治療内容】

● 1日-日目 Day1

1	ドセタキセル注 6.6mg/2mL 生理食塩液 50mL 点滴静注 15分	1v 1瓶	吐き気予防	
2	ヒルルビン注 生理食塩液 50mL 点滴静注 全開	25 mg/m ² 1瓶	抗がん剤	
3	生理食塩液 200mL 点滴静注 30分	1瓶	フラッシュ用	
4	トラスツマブ注 生理食塩液 250mL 点滴静注 90分	8 mg/kg 1袋	抗がん剤	

● 2日-日目以降 Day1

1	ドセタキセル注 6.6mg/2mL 生理食塩液 50mL 点滴静注 15分	1v 1瓶	吐き気予防	
2	ヒルルビン注 生理食塩液 50mL 点滴静注 全開	25 mg/m ² 1瓶	抗がん剤	
3	生理食塩液 200mL 点滴静注 30分	1瓶	フラッシュ用	
4	トラスツマブ注 生理食塩液 250mL 点滴静注 60分	6 mg/kg 1袋	抗がん剤	

トラスツマブは初回投与時の忍容性が良好であれば、2日-日目以降は60分に短縮可能

トラスツマブは28日以上間隔があった場合は、再度8mg/kgから投与を開始する

● 各日-日共通 Day8

1	ドセタキセル注 6.6mg/2mL 生理食塩液 50mL 点滴静注 15分	1v 1瓶	吐き気予防	
2	ヒルルビン注 生理食塩液 50mL 点滴静注 全開	1.4 mg/m ² 1瓶	抗がん剤	
3	生理食塩液 200mL 点滴静注 30分	1瓶	フラッシュ用	

【注意する副作用】

- ◆ 骨髄抑制（白血球・好中球減少、貧血、血小板減少）
 - ◆ 悪心・嘔吐
 - ◆ 食欲不振
 - ◆ 口内炎
 - ◆ 下痢
 - ◆ 便秘
 - ◆ 味覚異常
 - ◆ 脱毛
 - ◆ 末梢神経障害
 - ◆ 倦怠感
 - ◆ 爪の変化
 - ◆ 心毒性
 - ◆ 血管炎・血管痛
- など